





Monitoraggio zanzare AUTOCTONE




Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

Informazioni sulla DISINFESTAZIONE

Legenda

- aree umide
- focolai lineari



- ❖ I trattamenti larvicidi dei focolai lineari con prodotti biologici (*B.t.i.*) vengono effettuati con cadenza settimanale;
- ❖ Il secondo turno di disinfestazione dei tombini pubblici (marcatura blu) si è concluso con successo;
- ❖ I dati sul monitoraggio regionale della Zanzara Tigre sono disponibili su www.zanzaratigreonline.it;
- ❖ Non sono previsti trattamenti adulticidi di soccorso.

CAA S.r.l. (www.caa.it) – Base operativa di San Pietro in C.
Tel. 051.873436 - e-mail: rbellini@caa.it ; aalbieri@caa.it

DATI REGIONALI SU ZANZARA TIGRE DISPONIBILI NEL SITO INTERNET

WWW.ZANZARATIGREONLINE.IT

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DI LOTTA SUL SITO INTERNET WWW.CAA.IT